

IVERMEX^{Injection}

Ivermectin BP

ANTIPARASITIC INJECTION FOR CATTLE, SHEEP AND GOATS

آئیور میکس انجیکشن آئیور میکس (بی پی)

- ✓ **PRODUCT BENEFITS**
- ✓ **Kills internal and external parasites including worms, sucking lice and cattle tick.**
- ✓ **Wide margin of safety.**
- ✓ **Low volume, convenient injectable.**



Manufactured by:
WIMITS Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

IVERMEX^{Injection}

COMPOSITION:

Each ml contains
Ivermectin BP.....10 mg

INDICATIONS:

The active ingredient ivermectin, provides convenience, broad-spectrum efficacy and a high margin of safety.
One low-volume dose for effective treatment and control of internal and external parasites, including gastrointestinal roundworms, grubs, lungworms, sucking lice and mange mites.

BROAD-SPECTRUM PARASITE CONTROL:

When used as directed, IVERMAX Injection treats and controls the following parasites of cattle:
Gastrointestinal worms (adult and fourth stage larvae):
Ostertagia ostertagi (including inhibited larval stages),
Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (adult), Nematodirus helvetianus (adult), Nematodirus spathiger (adult), and Trichuris spp (adult).
Lungworms (adult and fourth stage larvae):
Dictyocaulus viviparus
Eyeworms (adult): Thelazia spp.
Warbles (parasitic stages):
Hypoderma bovis and Hypoderma lineatum
Mange Mites: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis
Sucking Lice: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, and Solenopotes capillatus.

PERSISTENT ACTIVITY:

At the recommended dose rate, Ivermax Injection effectively controls:

- Ostertagia spp. and Cooperia spp. acquired up to 7 days after treatment
- Dictyocaulus viviparus and Chrysomias bezziana acquired up to 14 days after treatment.

DOSAGE and ADMINISTRATION:

Subcutaneous injection.
1 ml per 50 Kg B.W.

To ensure administration of a correct dose, body weight should be determined as accurately as possible; accuracy of the dosing device should be checked.

Live weight	Dose volume	Cattle treated
Kg	ml	50 ml pack
Up to 100	2	25
101-150	3	16
151-200	4	12
201-250	5	10
251-300	6	8
301-350	7	7
351-400	8	6
401-450	9	5
451-500	10	5
501-550	11	4
551-600	12	4
601-650	13	4

Heavier animals should receive an additional 1 ml for each 50 Kg over 650 Kg

PRECAUTIONS:

Protect from heat and sunlight.
Store in a cool & dry place at 25°C.
Keep out of reach of children.
Consult veterinarian before use.

Shake well before use.

Don't use if the seal is leaking, solution is turbid or contains any foreign matter.

احتیاط:

گرمی اور دھوپ سے بچائیں۔
شہنڈی اور خشک جگہ میں ۲۵ ڈگری سینٹی گریڈ پر سٹور کریں۔
تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔
سیل کے لیک ہونے، دھندلا ہونے یا اس میں کوئی غیر حل پذیر شے نظر آنے کی صورت میں ہرگز استعمال نہ کریں۔

اہوازے ترکیبی: فی ملی لیٹر

آئیور میکس (بی پی).....۱۰ ملی گرام

علامات:

آئیور میکس انجیکشن جانوروں میں تمام بیرونی پیراسائٹس مثلاً جوں، چچڑ اور مائٹس کے خاتمہ کے لیے انتہائی مفید ہے۔

خوراک و استعمال: زیر جلد لگائیں

۱ ملی لیٹر فی ۵۰ کلو گرام جسمانی وزن

129-Sunder Industrial
Estate Lahore.

info@wimits.com

Phone: 042-37502921,
Fax: 042-37502922,

www.wimits.com