

LEVAMIT DRENCH

LEVAMISOLE HCl (B.P) 1.5% WV DRENCH

لیوامٹ ڈرینج

لیوامٹ ڈرینج (لیوامٹ ڈرینج)

A broad spectrum anthelmintic for use in the treatment and control of nematode infections in cattle, sheep & goats

مویشی، گائے، بھینس، بکری اور مرغیوں میں پیٹ کے کیڑوں کیلئے موثر دواء



Manufactured by:
WIMITS Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

129-Sunder Industrial Estate Lahore.

info@wimits.com

Phone: 042-37502921,
Fax: 042-37502922,

www.wimits.com



LEVAMIT DRENCH

COMPOSITION:

Each ml contains:
Levamisole HCl BP.....15 mg

INDICATIONS:

Levamisole drench is a broad spectrum anthelmintic that is effective in the treatment and control of all nematode infections in cattle, sheep and goats. This includes mature and immature stages of nematodes, including strains resistant to other anthelmintics. It is effective for the control of levamisole sensitive gastrointestinal roundworms and lungworms including those that are resistant to benzimidazoles.

Levamisole drench should be used in cases of parasitic gastro-enteritis and lungworm disease caused by mature and developing immature forms of those organisms sensitive to treatment with levamisole hydrochloride. It is effective against sensitive strains of the following internal parasites:

Sheep and Lamb:

Barbers pole worm, Stomach hair worm, Small brown stomach worm, Black scour worm, Small intestinal worm, Thin necked intestinal worm, Intestinal threadworm, Hookworm, Nodule worm, Large bowel worm, Large mouthed bowel worm, Large lungworm, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Strongyloides papillosus, Bunostomum spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum columbianum, Dictyocaulus filaria and Oesophagostomum venulosum.

Cattle:

Barbers pole worm, Stomach hair worm, Black scour worm, Hookworm, Nodule worm, Small intestinal worm, Thin necked intestinal worm, Lungworm, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus spp., Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Cooperia spp., Nematodirus spp., Dictyocaulus viviparus.

خوراک و استعمال:

بزرگ ڈرینجنگٹ گن پلائیں۔

گائے، بھینس۔۔۔۔۔ ۵۰ ملی لیٹر فی ۵۰ کلو گرام بحساب جسمانی وزن

بھینس، بکری۔۔۔۔۔ ۵۰ ملی لیٹر فی ۱۵۔۲۵ کلو گرام بحساب جسمانی وزن

احتیاط:

گرمی اور دھوپ سے بچائیں۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ جلد پر لگنے یا ناکھنے کی صورت میں نقصان دہ ہے۔ استعمال کے بعد ہاتھوں کو دھو لیں۔ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔

Lungworms: Dictyocaulus spp.

Gastrointestinal worms: Trichostrongylus spp; Cooperia spp; Ostertagia spp (except inhibited Ostertagia larvae in cattle); Haemonchus spp; Nematodirus spp; Chabertia spp; Bunostomum spp; and Oesophagostomum spp.



Barber pole worms ingest the host's blood, specifically the red blood cells making it appear more watery and less red.

DOSAGE & ADMINISTRATION:

To be given as a oral drench by a drenching gun at the following rate:

Cattle, Horse..... 25ml / 50 Kg. B.W.
Sheep, Goat..... 5ml/15-25 Kg B.W.

PRECAUTIONS:

Protect from heat and sunlight. Store in a cool & dry place at 25°C. Keep out of reach of children. Consult veterinarian before use. Harmful if absorbed by skin contact or swallowed by human. Wash hands after use. Shake well before use.

WITHDRAWAL TIME:

- Meat: 3 days,
- Milk: Milk taken from animals within 24 hours of last treatment must not be used for human consumption or processing. This milk should not be fed to baby calves.

PACKING: 100 ml and 1litre bottles.

اجزائے ترکیبی:

نی ملی لیٹر

لیوامٹ ڈرینج (لیوامٹ ڈرینج)۔۔۔۔۔ ۱۵ ملی گرام

علامات:

لیوامٹ ڈرینج میں موجود لیوامٹ ڈرینج، بھینس، بھیر اور بکریوں میں نیناؤڈائیکس کے کنٹرول کے لئے ایک وسیع الاثر ڈرینج ہے۔ جو نیناؤڈائیکس کے تمام بالغ اور نابالغ اقسام کا خاتمہ کرتی ہے۔ دیگر ڈرینجوں سے مزاحمت شدہ بکریوں کے خلاف انتہائی موثر ہے۔

Empowering animal health