

MEPRAWITS میپراویٹس

Injection انجیکشن

Mepyramine Maleate 5% Injection
ANTI-ALLERGIC

میپرامین مایلیٹ ۵ فیصد انجیکشن
اینٹی الرجک



Manufactured by:
WIMITS Wimits Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

MEPRAWITS میپراویٹس

Injection انجیکشن

COMPOSITION:

Each ml contains
Mepyramine Maleate BP.....50 mg

PROPERTIES:

Mepyramine Maleate is a competitive inhibitor at H1 tissue cell histaminic receptors. It attaches with great affinity to histamine receptors, preventing the untoward effects of histamine release. The binding of mepyramine to cell receptors evokes no direct cellular reaction. Mepyramine also has some antiserotonin properties.

Mepyramine is useful in counteracting the action of histamine on bronchial, intestinal, uterine and vascular smooth muscle. It antagonizes the vasodilator and vasoconstrictor effects of histamine, as well as the effect of increased capillary permeability. Meprawits may be used to counteract histamine induced urticaria, oedema formation and other allergic reactions, especially those associated with Type 1 (anaphylactic) and Type IV (cell-mediated or delayed) hypersensitivity reactions. Meprawits is useful as an adjunct to therapy in cases such as laminitis, feed

engagement, metritis and photosensitivity. A special use is made of mepyramine's initial CNS stimulatory action on recumbent cattle.

INDICATIONS:

Meprawits injection is an anti-allergic drug useful in counteracting the action of histamine on bronchial, intestinal, uterine and vascular smooth muscle. It is highly recommended in urticaria, metritis, mastitis oedema formation and other allergic reactions in cattle, horse, camel, sheep and pets.

DOSAGE and ADMINISTRATION:

For slow intravenous, intramuscular and subcutaneous injection in all species.
1-2ml per 50 Kg B.W. once daily
If required the dose can be repeated after 8-10 hours at the maximum for 3 days.

PRECAUTIONS:

Protect from heat and sunlight.
Store in a cool & dry place at 25°C.
Keep out of reach of children.
Consult veterinarian before use.
Don't use if the seal is leaking, solution is turbid or contains any foreign matter.

۲-۱ ملی لیٹر فی ۵۰ کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے روزانہ۔
اگر ضروری ہو تو ۸-۱۰ گھنٹوں بعد دوبارہ لگائیں۔
۳ دن سے زائد استعمال نہ کریں۔

احتیاط:

گرمی اور دھوپ سے بچائیں۔ ٹھنڈی اور خشک جگہ پر ۲۵ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر رکھیں۔ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔
ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ سیل کے لیک ہونے، دھندلا ہونے یا اس میں کوئی غیر حل پذیر شے نظر آنے کی صورت میں ہرگز استعمال نہ کریں۔

اجزائے ترکیبی:

فی ملی لیٹر

میپرامین مایلیٹ (بی پی) ۵۰ ملی گرام

علامات:

جانوروں میں جلدی امراض، حیوان کی سوزش، ادویات کے ری ایکشن، خوراک کے ذریعے اثرات، شہد کی مکھی اور بھڑکے ذریعے اثرات کے علاج کے لئے موثر دوا ہے۔

خوراک و استعمال:

نس میں، زیر جلد یا عضلاتی انجیکشن لگائیں

129-Sunder Industrial
Estate Lahore.

info@wimits.com

Phone: 042-37502921,
Fax: 042-37502922,

www.wimits.com