OXAMIT Drench


Oxfendazole B.P. (Vet)

اوکسامٹ ڈرینچ اوکسفینڈازول(بیپی-ویٹ)


چیوٹے بڑے جانوروں مثلاً بھینس، گائے، بھیڑ اور بکری میں آنت، معدہ اور پھیپیروں میں موجود بالغ و نا بالغ گول کرم اور شیپ ورم کے خاتمے کیلئے ایک وسیع العمل کرم کش دوا

Recommended for curative & prophylactic treatment of round worms, lung worms & tape worms in cattle, buffaloes, sheep & goats. It is also helpful in controlling liver fluke in sheep & goats, control & treatment of larval & adult round worms infestation in horses &





Empowering animal health



OXAMIT Drench

Oxfendazole B.P. (Vet)

COMPOSITION:

Each ml contains
Oxfendazole BP (Vet.).....22.65 mg

INDICATIONS:

Oxamit Drench is a broad spectrum anthelmintic for the control of mature and immature Roundworms, Lungworms and Tapeworms including inhibited Ostertagia in cattle. Oxamit Drench is ovicidal for strongyle eggs. It contains Oxfendazole, a member of the benzimidazole family of drenches. It is effective against sensitive strains of the following internal parasites in cattle, sheep and goats:

Barber's pole worm, Haemonchus placei,
Small brown stomach worm, Ostertagia ostertagi,
Stomach hair worm, Trichostrongylus axei,
Black scour worm, Trichostrongylus spp.,
Thin-necked intestinal worm, Nematodirus spp.,
Small intestinal worm, Cooperia spp.,
Hookworm Bunostomum phlebotomum,
Nodule worm, Oesophagostomum radiatum,
Lungworm, Dictyocaulus viviparus, Tapeworm,
Moniezia spp., Roundworm of horses, Parascaris
equorum, Pinworm Oxyuris equi, Strongyles
(adults), Strongylus spp.

Oxamit kills the tissue stages of Strongylus edentatus and at least 50% of the migrating stages of Strongylus vulgaris.

خوراک واستعال: گائے، بھینس، بھیڑ، بکری۔املی لیٹر نی ۵ کلو گرام بحساب جسمانی وزن گھوڑے، خچر۔املی لیٹر فی ۲-۲ کلو گرام بحساب جسمانی وزن

یں۔ گرمی اور د هوپ ہے بچائیں۔ تمام دوائیں بچوں کی پنتی ہے دور رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعال کریں۔ جلد پر گئنے یا نگلنے کی صورت میں نقصان دہ ہے۔ استعال کے ابعد ہاتھوں کو دھولیں۔ استعال ہے پہلے بوتل کو خوب بلالیں۔ The ovicidal activity of this product ensures that 4-6 hours after dosing, virtually all roundworm eggs passed in the dung are rendered infertile, thus reducing the potential for further pasture contamination.

To be fully effective, a period of six hours should elapse before drenched animals are moved onto clean pasture.

If it is inconvenient to hold animals for six hours and then move them on the same day, they may be returned to an infected pasture overnight and then moved the following day.

DOSAGE & ADMINISTRATION

Give the recommended dose by a standard Drenching Pistol/Gun. Administer horses with a stomach tube.

Cattle, Sheep & Goats----1ml/5 Kg B.W. Horses & Mules------1ml/2.2 Kg B.W.

PRECAUTIONS:

Protect from heat and sunlight.
Store in a cool & dry place at 25°C.
Keep out of reach of children.
Consult veterinarian before use.
Harmful if absorbed by skin contact or swallowed by human. Wash hands after use.
Shake well before use.

PACKING:

100 ml and 1 litre.

اجزائے ترکتیبی: فی ملی کیشر او سیننڈازول (بی پی-ویٹ)۔۔۔۔۔۔۲۵۲ملی گرام علامات:

اوکسامٹ ڈرمنج ایک وسیع العمل کرم مُش دواہے جو چھوٹے بڑے جانوروں مثلاً جھینس، گائے ، جھیڑا ور بکری میں آنت ، معدہ اور پیھیپروں میں موجود بالغ و نابالغ محول کرم اور ٹیپ ورم کے خاتے کیلئے انتہائی موئٹر ہے۔ مزید بران میں گول کر مول کے لاروااورانڈوں کو بھی تلف کرتی ہے۔







