


Trigger


Water Soluble Powder

حل پزیر پاؤڈر
ٹریگر

Doxycycline Hyclate & Tylosin Tartrate



The additive combination
acting as EXTRA FORCE
against tough INFECTIONS



Manufactured by:
WIMITS Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

Marketed by:
Bio Vision
CORPORATION

Trigger

Water Soluble Powder

حل پزیر پاؤڈر
ٹریگر

Doxycycline Hyclate & Tylosin Tartrate

COMPOSITION:

Each gm contains:
Doxycycline Hyclate BP.....250 mg
Tylosin Tartrate BP.....200 mg

DESCRIPTION:

The combination of two broad spectrum antibiotics which effectively covers G+ve, G-ve bacteria & most of the Mycoplasma spp.

Doxycycline belongs to the group of tetracyclines and acts bacteriostatic against many Gram-positive and Gram-negative bacteria like Bordetella, E. coli, Campylobacter, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella Staphylococcus and Streptococcus spp. It is also active against Chlamydia, Mycoplasma and Rickettsia spp. The action of doxycycline is based on inhibition of bacterial protein synthesis. It has a great affinity to the lungs and is therefore especially useful for treatment of bacterial respiratory infections.

Tylosin is a macrolide antibiotic with a bacterio-static action against Gram-positive and Gram-negative bacteria like Campylobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus and Treponema spp., and Mycoplasma.

خوراک و استعمال:

مریٹوں کیلئے: ۱.۳-۳.۳ لیٹر پینے کے پانی میں ۰.۳-۰.۵ دن تک استعمال کریں۔
چھڑوں کیلئے: ۰.۲۴۵ گرام فی ۵۰ گلوگرام جسمانی وزن کیلئے ۰.۳-۰.۵ دن تک استعمال کریں۔

احتیاط:

گرھی، دھوپ اور نمی سے بچائیں۔
نظام دوائی بچوں کی تکف سے دور رکھیں۔
ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔

INDICATIONS:

Trigger water soluble powder is indicated for poultry in the treatment of diseases like CRD, CCRD, ORT, Mycoplasmosis, Fowl Cholera, Salmonellosis, Collibacillosis, Gastrointestinal and Coryza. It is also effective against infections caused by micro organisms sensitive to Tylosin and Doxycycline.

DOSAGE & ADMINISTRATION

For oral administration:

POULTRY:

1 gram in 3-4 litres of drinking water for 3-5 days.

CALVES:

0.625 gram per 50 Kg body weight for 3-5 days.

CAUTION

Store in a cool and dry place at 25°C.
Close jar tightly after use.
Protect from heat, light and moisture.
Keep out of reach of children.
Consult veterinarian before use.
Wash hands after use.

PACKING

Jar of 500 and 1000 grams

اچھڑے ترکیبی:

فی گرام پاؤڈر میں
ڈوکسی سائیکلین ہائیڈریٹ (بی بی) ۰.۲۵۰ ملی گرام
ٹائوسین ٹارٹریٹ (بی بی) ۰.۲۰۰ ملی گرام

علامت:

ٹریگر (حل پزیر پاؤڈر) مریٹوں میں سی آر ڈی، سی سی آر ڈی، او آر ٹی، مائیکو۔ پلازموسیس، فاول کولرا، سالمونیلوسس، کولی میسی لوسس، نظام ہضم اور نظام تنفس کی بیماریوں، نیز ڈوکسی سائیکلین اور ٹائوسین سے حساس جراثیم سے پیدا شدہ بیماریوں کی مختلف انتہائی موثر ہے۔

129-Sunder Industrial
Estate Lahore.

info@wimits.com

Phone: 042-37502921,
Fax: 042-37502922,

www.wimits.com

Empowering animal health