

# TRINEX INJ. 48%

COMBINATION OF ANTIBIOTIC

انجیکشن  
ٹرائی نیکس

Trimethoprim + Sulfadiazine (ٹرائی میتھوپریم (بی پی) + سلفاڈایازین (بی پی))

Presenting Cost-effective  
treatment solution

Broad Spectrum

Bactericidal synergistic combination

Rapid action

Resistance to combination is rare



Effective Against

UROGENITAL TRACT INFECTIONS

JOINT ILL

SEVERE MASTITIS

FOOT-ROOT

RESPIRATORY INFECTIONS

ALIMENTARY TRACT INFECTIONS

WOUND INFECTION

Manufactured by:  
**WIMITS** Pharmaceuticals (Pvt.) Ltd.

# TRINEX INJ. 48%

انجیکشن  
ٹرائی نیکس

## COMPOSITION:

Each ml contains  
Trimethoprim BP.....80 mg  
Sulfadiazine BP.....400 mg

## DESCRIPTION:

The combination of trimethoprim and sulfadiazine acts synergistically and usually bactericidal against many Gram-positive and Gram-negative bacteria like E. coli, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus and Streptococcus spp. Both compounds affect bacterial purine synthesis in a different way, as a result of which a double blockade is accomplished.

## INDICATIONS:

Trinex injection is indicated for the treatment of a wide range of diseases, respiratory infections, urogenital, alimentary tract infections, mastitis, bacterial diarrhoea and septicemia in cattle, sheep and goats.

## CONTRA INDICATIONS:

Hypersensitivity to trimethoprim and/or sulfonamides.  
Administration to animals with a seriously impaired renal and/or hepatic function, or with blood dyscrasias is contraindicated.

## SIDE EFFECTS:

After long-term treatment and high dosages, crystalluria may occur.  
When symptoms of crystalluria occur (e.g. haematuria, kidney colic), treatment should be ceased immediately and, for example, sodium carbonate administered for an alkalinizing effect in order to increase sulfadiazine's solubility in urine. Administration for a prolonged period of time also increases the risk for blood dyscrasias.  
Anaemia, leucopenia and thrombocytopenia.

## DOSAGE and ADMINISTRATION:

Intramuscular or slow intravenous injection. In Sheep & Goats administration is by Intramuscular injection only.

**Cattle, sheep & goats:** 1-1.5 ml per 30kg B.W. daily for 3-5 days.

## PRECAUTIONS:

Protect from heat and sunlight.  
Store in a cool & dry place at 25°C.  
Keep out of reach of children.  
Consult veterinarian before use.  
Don't use if the seal is leaking, solution is turbid or contains any foreign matter..

**SHAKE WELL BEFORE USE.**

اجزائے ترکیبی:

فی ملی لیٹر

ٹرائی میتھوپریم (بی پی) --- ۸۰ ملی گرام

سلفاڈایازین (بی پی) --- ۴۰۰ ملی گرام

علامات:

ٹرائی نیکس انجیکشن ایک وسیع العمل اینٹی بائیوٹک دوا ہے جو گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں میں تمام بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماریوں مثلاً تھنوں کی خرابی، رحم اور آنتوں کی سوزش، جلدی بیماریاں، نمونیا اور بخار میں انتہائی موثر ہے۔

خوراک و استعمال:

گائے، بھینس اور بھیڑ بکریوں میں بحساب ۱-۱.۵ ملی لیٹر فی ۳۰ کلو گرام جسمانی وزن گوشت یا نس میں آہستگی سے ۳-۵ دن تک لگائیں۔

احتیاط:

گرمی اور دھوپ سے بچائیں۔ ٹھنڈی اور خشک جگہ پر ۲۵ ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر رکھیں۔ تمام دوائیوں کی تیاری سے دور رکھیں۔ ویٹرنری ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ سئل کے لیک ہونے، دھندلا ہونے یا اس میں کوئی غیر حل پذیر شے نظر آنے کی صورت میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔

129-Sunder Industrial  
Estate Lahore.

info@wimits.com

Phone: 042-37502921,  
Fax: 042-37502922,

www.wimits.com